


RX

ROSUVASTATIN

Comprimés de rosuvastatine calcique 5 mg

DIN 02477033




Recto: 5 Verso: IR

FORMAT	TAILLE RÉELLE
BO 100	Comprimés

Comprimés de rosuvastatine calcique 10 mg

DIN 02477041




Recto: 10 Verso: IR

FORMAT	TAILLE RÉELLE
BO 100	Comprimés
BO 500	

PRODUIT DE RÉFÉRENCE
CRESTOR®
(ASTRAZENECA)

Comprimés de rosuvastatine calcique 20 mg

DIN 02477068




Recto: 20 Verso: IR

FORMAT	TAILLE RÉELLE
BO 100	Comprimés
BO 500	

Comprimés de rosuvastatine calcique 40 mg

DIN 02477076



Recto: 40 Verso: IR

FORMAT	TAILLE RÉELLE
BO 100	Comprimés

FORCE	FORMAT	CODE UPC	McKesson	Familiprix	McMahon	K&F	DP+
5 mg	BO 100	622082 29093 5	-	119332	-	-	29093
10 mg	BO 100	622082 29094 2	-	119379	-	-	29094
	BO 500	622082 29095 9	-	119389	-	-	29095
20 mg	BO 100	622082 29096 6	-	119398	-	-	29096
	BO 500	622082 29097 3	-	119403	-	-	29097
40 mg	BO 100	622082 29098 0	-	119410	-	-	29098

RX

ROSUVASTATIN

INFORMATIONS PRODUIT

USAGE THÉRAPEUTIQUE	Régulateur du métabolisme des lipides
CLASSE THÉRAPEUTIQUE	24:06.08 Inhibiteurs de la HMG-CoA réductase
INDICATION	<p>Hypercholestérolémie Adultes Indiqué comme traitement adjuvant à un régime alimentaire équivalant au moins à la diète ATP III (recommandations du Adult Treatment Panel III), pour la réduction d'une valeur élevée du cholestérol total (CT), du cholestérol des lipoprotéines de basse densité (C-LDL), de l'apolipoprotéine B (apo B), du ratio CT/C-HDL et des triglycérides (TG), de même que pour l'augmentation du cholestérol des lipoprotéines de haute densité (C-HDL); lorsque la réponse à un régime alimentaire et à l'exercice seuls a été insuffisante dans des cas d'hyperlipidémie et de dyslipidémie.</p> <p>Enfants (10-17 ans) Indiquée comme traitement adjuvant à un régime alimentaire pour la réduction d'une valeur élevée du cholestérol total (CT), du C-LDL et de l'apo B chez les garçons et les filles, au moins un an après l'apparition des premières règles, de 10 à 17 ans atteints d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote, lorsque la réponse à un régime alimentaire seul a été insuffisante.</p> <p>Prévention des événements cardiovasculaires majeurs Indiquée pour réduire le risque : - d'infarctus du myocarde non mortel - d'accident vasculaire cérébral (AVC) non mortel - de revascularisation des artères coronaires.</p>
INGRÉDIENT ACTIF	Rosuvastatine calcique
INGRÉDIENTS NON-MÉDICINAUX	Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, crospovidone, oxyde de magnésium, dioxyde de silice colloïdal, stéarate de magnésium, hydroxypropyl méthylcellulose, triacétine, lactose, dioxyde de titane, laque AD&C rouge, laque AD&C jaune.
DURÉE DE CONSERVATION	24 mois
ENTREPOSAGE	Conserver à température ambiante (15-30 °C).

INFORMATIONS LOGISTIQUES

		UNITÉS	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)
Caisse	5 mg - 100	240	35	27.5	35.5	8.9
Unité	5 mg - 100	1	3.7	3.7	6.4	0.032
Caisse	10 mg - 100	240	35	27.5	35.5	8.9
Unité	10 mg - 100	1	3.7	3.7	6.4	0.032
Caisse	10 mg - 500	72	37	25	31	8.6
Unité	10 mg - 500	1	5.6	5.6	9.5	0.108
Caisse	20 mg - 100	192	35	27.5	35.5	11.1
Unité	20 mg - 100	1	3.95	3.95	7.85	0.05
Caisse	20 mg - 500	60	43.5	37.5	23.3	12.9
Unité	20 mg - 500	1	6.6	6.6	10.5	0.198
Caisse	40 mg - 100	192	35	27.5	35.5	11.1
Unité	40 mg - 100	1	3.95	3.95	7.85	0.05